

Lokalname : La Ghana  
 Flächengröße : 2,9 ha.; Größe eines normales Feldes = 200 m<sup>2</sup> (16 . 12,5)  
 Datum der Anlage : 20.3. - 17.4.57  
 Versuchsfrage : 1. können 1 u. 2. j. Sämlinge in Aufforstung in der Kastanienzone verwendet werden ?  
 2. Welche Pflanzbestände sind in der Kastanienzone angezeigt ? Wie wird die Pflegearbeit und die Bestandesentwicklung dadurch beeinflusst ?  
 3. Einfluss der Herkunft auf Frage 1 u. 2  
 4. Generelle Information über geeignete Herkünfte verschiedener Arten im vorliegenden Gebiet  
 5. Später : Mischung und Vorwald  
 Pflanzenzahl : Total ; 12'425 St.

Holzart		Nr.
Pseudotsuga menziesii	Douglas	41
Picea abies	Fichte	21
Populus tremula	Aspe	78

Feld - Nr.	o49	o50	o51	o52	o53	o54	o55	o56
Fläche m <sup>2</sup>	200	200	200	200	200	200	200	200
Pflanzungsdatum	30.3.57	30.3.57	5.4.57	10.4.57	28.3.57	28.3.57	28.3.57	29.3.57
Holzart (Reihe)	41	41	** 21	41	41	41	78	21
Herkunft (Reihe)	(1+2) o11	(1-3) o11	(1-4) o34	oo3	( 1 ) o1o	(1+2) o1o	(1-6) oo2	(1-4) oo6
" "	3+4 o13	4-6 o13	5-8 oo6		2 oo3	3+4 o13		5-8 oo4
" "		7-9 o1o	9-12 o35		3 o13	5+6 o11		9-12 ool
" "		10-12 oo3			4 o11			
Stück	24	185	175	118	24	48	47	173
Pflanzverband	3,0.3,0	1,0.1,0	1,0.1,0	1,0.1,5	3,0.3,0	2,0.2,0	2,0.2,0	1,0.1,0
Sämlingsalter	1/0	1/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0
Pflanztechnik	nackt u. Loch	*nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	*nackt u. Loch *	nackt u. Loch*	nackt u. Loch*	nackt u. Loch *
Düngung								
Jungwuchspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen	61	61	61	61	61	61	61	61

ERGÄNZUNG

ABGEBRANNT

JAN. 63

INTERPFLANZ

Bemerkungen : \* Nacktwurzelige Pflanzen ; Abzug mit der Haue, darin mit Pflanzlochbohrer, nachbessern der Löcher mit Haue, dann Pflanzung  
 \*\* Wurde im 1961 mit Aramo-Lärchen ergänzt, da die Fichten schlecht kamen, d.h. schon als schlechtes Material gepflanzt wurde  
 65 im Feldss Knospen gebrochen 1965+66  
 im ganzen Vers. Feldrändern gegen Auspflanzung hin freigeben